

Sal isopropilamina de Glifosato
Herbicida agrícola / Solución acuosa
RSCO-HEDE-0230-X0229-013-41.00

DRA

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:

SAL ISOPROPILAMINA DE GLIFOSATO: 2- (fosfonometil-amino) acetato con un contenido de ácido glifosato no menor de 74.00%

(Equivalente a 360 g de ácido/L a 20° C)

(Contiene 486 g/L de sal isopropilamina de glifosato).....**41.00%**

INGREDIENTES INERTES:

Neutralizante, humectante, quelante, acondicionador y diluyente

59.00%

TOTAL: 100.0%



NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 5, PRECAUCIÓN, BANDA VERDE
“ALTO LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

CAYAANA es un herbicida no selectivo con actividad sistémica. El ingrediente activo es translocado desde el follaje de las plantas tratadas, a las raíces, rizomas y meristemas apicales. Esta propiedad sistémica permite la destrucción total de las malezas perennes. Este herbicida se inactiva al contacto con el suelo y agua con materia orgánica en suspensión. Se recomienda para el control de las plagas de los cultivos que se indican en el siguiente cuadro:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/HA	INTERVALO DE SEGURIDAD (días) ²	
Acelga	Zacate Johnson (Sorghum halepense)	2.0-4.0	Sin límite	
	Coquillo (Cyperus esculentus)	3.0-4.0		
	Lampotillo, gigantón, acahual (Thithonia tubaeiformis)			
	Lengua de vaca (Rumex crispus)			
	Mala mujer (Solanum nigrum)			
	Guinar (Sida rhombifolia)			
	Estrellita,rosilla chica (Gallinsoga parviflora)	4.0-8.0		
	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon).			
	Acahuallilo,mozote* (Bidens pilosa)			3.0-5.0
	Lechosa (Euphorbia heterophylla)			
Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)	4.0-8.0			
Bledo rojo (Amaranthus retroflexus)*				
Agave	Zacate rayado (Echinochloa crus-galli)	1.0-2.0	SIN LÍMITE	
	Cola de ardilla (Eragrostis mexicana)			
	Luzaga, zacate pata de gallina* (Digitaria sanguinalis)			
	Pasto de conejo (Chloris virgata)			
	Zacate camalote (Brachiaria plantaginea)			
	Bledo común (Amaranthus spinosum)*	1.0-3.0		
	Quelite cenizo (Chenopodium album)	1.5-3.0		
	Bolsa del pastor (Capsella bursa-pastoris)			
	Verdolaga (Portulaca oleracea)			
	Malva (Malva sp.)			
	Campanilla (Ipomoea purpurea)			
	Mala mujer (Solanum nigrum)	3.0-4.0		
	Lengua de vaca (Rumex crispus)			
Estrellita, rosilla chica (Gallinsoga parviflora)				
Guinar (Sida rhombifolia)				
Lampotillo, gigantón, acahual* (Thithonia tubaeiformis)				
Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)				

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/HA	INTERVALO DE SEGURIDAD (días) ²
Aguacate	Coquillo (Cyperus sp.)	4.0-6.0	SIN LÍMITE
	Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)	4.0-8.0	
	Cola de ardilla, llendrilla* (Eragrostis mexicana)	1.0-2.0	
	Luzaga, zacate pata de gallina* (Digitaria sanguinalis)		
	Pasto de conejo, zacate mota* (Chloris virgata)		
	Zacate camalote, zacate horquetilla* (Brachiaria plantaginea)		
	Zacate camalote (Brachiaria plantaginea)		
	Quelite cenizo (Chenopodium album) Bolsa del pastor (Capsella bursa-pastoris) Verdolaga (Portulaca oleracea) Malva (Malva sp.)	1.5-3.0	
	Campanilla, correhuela anual (Ipomoea purpurea)		
	Hierba mora (Solanum nigrum)		
	Quelite, bledo (Amaranthus albus)		
	Zacate rayado (Echinochloa crus-galli)		
	Zacate Johnson (Sorghum halepense)	2.0-4.0	
	Zacate guinea (Panicum maximum) Lampotillo, gigantón, acahual* (Tithonia tubaeiformis)	3.0-4.0	
	Lengua de vaca (Rumex crispus)		
Estrellita, rosilla chica (Gallinsoga parviflora) Guinar, maravilla*(Sida rhombifolia)			
Hierba del pollo (Commelina erecta)	5.0		
Coquillo, coyotillo* (Cyperus rotundus) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana*(Cynodon dactylon) Coquillo (Cyperus sp.)	4.0-6.0		
Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)		4.0-8.0	
Ajo	Quelite cenizo (Chenopodium album) Perita, perilla (Lopezia racemosa) Hierba del pastor (Acalipha virginica) Quintonil (Amaranthus hybridus)	1.5-2.5	
	Lechosa, golondrina (Euphorbia heterophylla) Zacate Johnson (Sorghum halepense)		2.0-4.0
	Lampotillo, gigantón, acahual* (Tithonia tubaeiformis)	3.0-4.0	
	Lengua de vaca (Rumex crispus)		
	Estrellita, rosilla chica (Gallinsoga parviflora)		
	Mala mujer (Solanum nigrum)		
	Guinar, maravilla* (Sida rhombifolia)		
	Coquillo (Cyperus sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon) Coquillo (Cyperus sp.)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis) Bledo rojo (Amaranthus retroflexus)		4.0-8.0

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/HA	INTERVALO DE SEGURIDAD (días) ²
Alcachofa	Lechosa (Euphorbia heterophylla) Zacate Johnson (Sorghum halepense)	2.0-4.0	SIN LÍMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual (Tithonia tubaeiformis) Lengua de vaca (Rumex crispus) Estrellita, rosilla chica (Gallinsoga parviflora) Mala mujer (Solanum nigrum) Guinar, maravilla* (Sida rhombifolia)	3.0-4.0	
	Coquillo (Cyperus sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)	4.0-6.0	
	Bledo rojo (Amaranthus retroflexus) Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)	4.0-8.0	
	Lechosa, golondrina (Euphorbia heterophylla) Zacate Johnson (Sorghum halepense)	2.0-4.0	
Alfalfa	Lampotillo, gigantón, acahual (Tithonia tubaeiformis) Lengua de vaca (Rumex crispus) Estrellita, rosilla chica (Gallinsoga parviflora) Mala mujer (Solanum nigrum) Guinar, maravilla (Sida rhombifolia)	3.0-4.0	SIN LÍMITE
	Coquillo (Cyperus sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis) Bledo rojo (Amaranthus retroflexus)	4.0-8.0	
	Lechosa, golondrina (Euphorbia heterophylla) Zacate Johnson (Sorghum halepense)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual (Tithonia tubaeiformis) Lengua de vaca (Rumex crispus) Estrellita, rosilla chica (Gallinsoga parviflora) Mala mujer (Solanum nigrum) Guinar, maravilla (Sida rhombifolia)	3.0-4.0	
Apio	Zacate gramma, pasto bermuda (Cynodon dactylon)	4.0-6.0	SIN LÍMITE
	Coquillo (Cyperus sp.)	6.0	
	Bledo rojo (Amaranthus retroflexus)* Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)	4.0-8.0	
	Coquillo (Cyperus esculentus) Lengua de vaca (Rumex crispus) Mala mujer (Solanum nigrum) Guinar, maravilla (Sida rhombifolia) Zacate gramma, pasto bermuda estrella africana* (Cynodon dactylon)	3.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (Tithonia tubaeiformis) Estrellita, rosilla chica (Gallinsoga parviflora)	3.0-4.0	
Arroz	Bledo rojo (Amaranthus retroflexus)	4.0-8.0	SIN LÍMITE

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/HA	INTERVALO DE SEGURIDAD (días) ²
Avena	Zacate Johnson (Sorghum halepense)	2.0-4.0	SIN LÍMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual (Tithonia tubaeiformis)	3.0-4.0	
	Lengua de vaca (Rumex crispus)		
	Estrellita, rosilla chica (Gallinsoga parviflora)		
	Mala mujer (Solanum nigrum)		
	Guinar (Sida rhombifolia)		
Berenjena	Coquillo (Cyperus sp.)	4.0-6.0	SIN LÍMITE
	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)	4.0-8.0	
	Bledo rojo (Amaranthus retroflexus)		
Betabel	Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)	4.0-8.0	SIN LÍMITE
	Bledo rojo (Amaranthus retroflexus)	3.0-4.0	
	Lechosa, golondrina (Euphorbia heterophylla)		
	Zacate Johnson (Sorghum halepense)		
	Lampotillo, gigantón (Tithonia tubaeiformis)		
	Lengua de vaca (Rumex crispus)		
Brocoli	Estrellita, rosilla chica (Gallinsoga parviflora)	3.0-4.0	SIN LÍMITE
	Mala mujer (Solanum nigrum)		
	Guinar, maravilla (Sida rhombifolia)		
	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)		
	Coquillo (Cyperus sp.)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)	4.0-8.0	
Cacahuete	Lechosa, golondrina (Euphorbia heterophylla)	2.0-4.0	SIN LÍMITE
	Zacate Johnson (Sorghum halepense)	3.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (Tithonia tubaeiformis)		
	Lengua de vaca (Rumex crispus)		
	Estrellita, rosilla chica (Gallinsoga parviflora)		
	Mala mujer (Solanum nigrum)	4.0-6.0	
Guinar, maravilla* (Sida rhombifolia)			
Cacahuete	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)	4.0-8.0	
	Coquillo (Cyperus sp.)		
	Bledo rojo (Amaranthus retroflexus)	4.0-8.0	
Cacahuete	Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)	4.0-8.0	SIN LÍMITE

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/HA	INTERVALO DE SEGURIDAD (días) ²
Cacao	Hierba del pollo (Commelina erecta)	2.0-3.0 ¹	SIN LIMITE
	Oreja de elefante (Anthurium spp.)		
	Zacate perfumado (Oplismenus hirtellus)		
	Zacate rayado (Echinochloa crus-galli) SIN LIMITE	1.0-2.0	
	Cola de ardilla, liendrilla* (Eragrostis mexicana) Luzaga, zacate pata de gallina *(Digitaria sanguinalis)		
	Pasto de conejo, zacate mota* (Chloris virgata)		
	Zacate camalote (Brachiaria plantaginea)		
	Bledo común (Amaranthus spinosum)		
	Quelite cenizo (Chenopodium album) Bolsa del pastor (Capsella bursa-pastoris) Verdolaga (Portulaca oieracea)	1.5-3.0	
	Malva (Malva sp.)		
	Campanilla (Ipomoea purpurea)		
	Zacate Johnson (Sorghum halepense)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (Thithonia tubaeiformis)	3.0-4.0	
	Mala mujer (Solanum nigrum)	3.0-4.0	
Coquillo (Cyperus sp.)	4.0-6.0		
Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)			
Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)	4.0-8.0		
Cafeto	Mala mujer (Solanum nigrum)	1.5-3.0	SIN LÍMITE
	Quelite cenizo (Chenopodium album)		
	Bolsa del pastor (Capsella bursa-pastoris)		
	Verdolaga (Portulaca oleracea)		
	Malva (Malva sp.)		
	Campanilla (Ipomoea purpurea)	1.0-2.0	
	Zacate rayado (Echinochloa crus-galli)		
	Cola de ardilla, liendrilla* (Eragrostis mexicana)		
	Luzaga, zacate pata de gallina *(Digitaria sanguinalis)		
	Pasto de conejo, zacate mota*(Chloris virgata)		
	Zacate camalote (Brachiaria plantaginea)	2.0-4.0	
	Zacate Johnson (Sorghum halepense)		
	Lampotillo, gigantón, acahual*(Thithonia tubaeiformis)	3.0-4.0	
	Coquillo (Cyperus sp.)	4.0-6.0	
Bledo rojo (Amaranthus retroflexus)			
Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)			
Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)	4.0-8.0		
Calabaza	Lechosa, golondrina (Euphorbia heterophylla)	2.0-4.0	SIN LÍMITE
	Zacate Johnson (Sorghum halepense)		
	Lampotillo, gigantón, acahual*(Thithonia tubaeiformis)	3.0-4.0	
	Coquillo (Cyperus sp.)	4.0-6.0	
	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)		
	Bledo rojo (Amaranthus retroflexus)		
	Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)	4.0-8.0	
Lampotillo, gigantón, acahual* (Thithonia tubaeiformis)	3.0-4.0		
Caña de azúcar	Zacate Johnson (Sorghum halepense)	5.0-6.0	SIN LÍMITE
	Zacate de agua (Echinochloa colonum)		
	Zacate pitillo (Ixophorus unisetus)		
	Campanilla (Ipomoea purpurea)		
	Zacate rayado (Echinochloa crus-galli)	1.0-2.0	
Cola de ardilla, liendrilla* (Eragrostis mexicana)			
Luzaga, zacate pata de gallina *(Digitaria sanguinalis)			
Pasto de conejo, zacate mota* (Chloris virgata)			
Zacate camalote (Brachiaria plantaginea)			

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/HA	INTERVALO DE SEGURIDAD (días) ²
Cebada	Bledo común (Amaranthus spinosum) Quelite cenizo (Chenopodium album) Bolsa del pastor (Capsella bursa-pastoris) Verdolaga (Portulaca oleracea) Malva (Malva sp.) Mala mujer (Solanum nigrum) Campanilla (Ipomoea purpurea)	1.5-3.0	SIN LÍMITE
	Lechosa, golondrina (Euphorbia heterophylla) Zacate Johnson (Sorghum halepense)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (Thithonia tubaeiformis)	3.0-4.0	
	Coquillo (Cyperus sp.)	4.0-6.0	
	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)		
	Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)	4.0-8.0	
	Estrellita, rosilla chica (Gallinsoga parviflora) Quintonil (Amaranthus hybridus) Quelite cenizo (Chenopodium album) Perita, perilla (Lopezia racemosa) Hierba del pastor (Acalipha virginica) Lechosa, golondrina (Euphorbia heterophylla)	1.5-2.5	
	Zacate Johnson (Sorghum halepense)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón acahual* (Thithonia tubaeiformis)	3.0-4.0	
	Coquillo (Cyperus sp.)	4.0-6.0	
Cebolla	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)		SIN LÍMITE
	Bledo rojo (Amaranthus retroflexus) Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)	4.0-8.0	
	Lechosa, golondrina (Euphorbia heterophylla) Zacate Johnson (Sorghum halepense)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (Thithonia tubaeiformis)	3.0-4.0	
	Coquillo (Cyperus sp.)	4.0-6.0	
	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)		
	Bledo rojo (Amaranthus retroflexus) Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)	4.0-8.0	
	Lechosa, golondrina (Euphorbia heterophylla) Zacate Johnson (Sorghum halepense)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (Thithonia tubaeiformis)	3.0-4.0	
	Coquillo (Cyperus sp.)	4.0-6.0	
Centeno	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)		SIN LÍMITE
	Bledo rojo (Amaranthus retroflexus) Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)	4.0-8.0	
	Zacate rayado (Echinochloa crus-galii) Cola de ardilla, liendrilla* (Eragrostis mexicana) Luzaga, zacate pata de gallina* (Digitaria sanguinalis) Pasto de conejo, zacate mota* (Chloris virgata) Zacate camalote (Brachiaria plantaginea)	1.0-2.0	
	Bledo común (Amaranthus spinosum) Mala mujer (Solanum nigrum) Quelite cenizo (Chenopodium album) Bolsa del pastor (Capsella bursa-pastoris) Malva (Malva sp.) Verdolaga (Portulaca oleracea) Campanilla (Ipomoea purpurea)	1.5-3.0	
	Lechosa, golondrina (Euphorbia heterophylla) Zacate Johnson (Sorghum halepense)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (Thithonia tubaeiformis)	3.0-4.0	
	Coquillo (Cyperus sp.)	4.0-6.0	
	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)		
	Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)	4.0-8.0	
Ciruelo			SIN LÍMITE

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/HA	INTERVALO DE SEGURIDAD (días) ²
Cítricos	Zacate rayado (Echinochloa crus-galli)	1.0-2.0	SIN LÍMITE
	Cola de ardilla, liendrilla*(Eragrostis mexicana)		
	Luzaga, zacate pata de gallina *(Digitaria sanguinalis)		
	Pasto de conejo, zacate mota*(Chloris virgata)		
	Zacate camalote (Brachiaría plantaginea)		
	Lampotillo, gigantón, acahual*(Thithonia tubaeiformis)	1.5-3.0	
	Mala mujer (Solanum nigrum)		
	Bledo común (Amaranthus spinosum)		
	Quelite cenizo (Chenopodium album)		
	Bolsa del pastor (Capsella bursa-pastoris)		
	Verdolaga (Portulaca oleracea)	2.0-4.0	
	Malva (Malva sp.)		
	Campanilla (Ipomoea purpurea)		
	Lechosa, golondrina (Euphorbia heterophylla)		
	Zacate Johnson (Sorghum halepense)		
Bledo rojo (Amaranthus retroflexus)	5.0		
Hierba del pollo (Commelina erecta)	4.0-6.0		
Coquillo (Cyperus sp.)			
Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)			
Correhuela de la mañana (Convolvulus arvensis)			
Correhuela de la mañana (Convolvulus arvensis)			
Zacate pitillo (Ixophorus unisetus)	6.0		
Zacate guinea (Panicum maximum)			
Quelite, bledo (Amaranthus albus)			
Zacate hierba del conejo (Digitaria filiformis)			
Pata de gallo (Eleusine indica)			
Rosilla (Gallinsoga hispida)			
Flor amarilla (Melampodium divaricatus)			
Acahualillo (Bidens pilosa)			
Golondrina, arlomo (Boerhavia erecta)			
Cola de zorra (Setaria lutescens)			
Zacate (Paspalum virginata)			
Zacate (Hyparthenia rufa)			
Coquillo, coyotillo* (Cyperus rotundus)			
Coliflor	Lechosa, golondrina (Euphorbia heterophylla)	2.0-4.0	SIN LÍMITE
	Zacate Johnson (Sorghum halepense)	3.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual*(Thithonia tubaeiformis)		
	Coquillo (Cyperus sp.)		
	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)		
Bledo rojo (Amaranthus retroflexus)	4.0-8.0		
Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)			
Chicharo	ZLechosa, golondrina (Euphorbia heterophylla)	2.0-4.0	SIN LÍMITE
	Zacate Johnson (Sorghum halepense)	3.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (Thithonia tubaeiformis)		
	Coquillo (Cyperus sp.)		
	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)		
Bledo rojo (Amaranthus retroflexus)	4.0-8.0		
Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)			
Chile	ZLechosa, golondrina (Euphorbia heterophylla)	2.0-4.0	SIN LÍMITE
	Zacate Johnson (Sorghum halepense)	3.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (Thithonia tubaeiformis)		
	Coquillo (Cyperus sp.)		
	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)		
Bledo rojo (Amaranthus retroflexus)	4.0-8.0		
Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)			

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/HA	INTERVALO DE SEGURIDAD (días) ²
Durazno	Zacate rayado (Echinochloa crus-galli) Cola de ardilla, liendrilla* (Eragrostis mexicana) Luzaga, zacate pata de gallina * (Digitaria sanguinalis) Pasto de conejo, zacate mota* (Chloris virgata) Zacate camalote (Brachiaria plantaginea)	1.0-2.0	SIN LÍMITE
	Mala mujer (Solanum nigrum) Bledo común (Amaranthus spinosum) Quelite cenizo (Chenopodium album) Bolsa del pastor (Capsella bursa-pastoris) Verdolaga (Portulaca oleracea) Malva (Malva sp.) Campanilla (Ipomoea purpurea)	1.5-3.0	
	Lechosa, golondrina (Euphorbia heterophylla) Zacate Johnson (Sorghum halepense)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (Thithonia tubaeiformis)	3.0-4.0	
	Coquillo (Cyperus sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)	4.0-8.0	
	Lechosa, golondrina (Euphorbia heterophylla) Zacate Johnson (Sorghum halepense)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (Thithonia tubaeiformis)	3.0-4.0	
	Coquillo (Cyperus sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)	4.0-6.0	
	Bledo rojo (Amaranthus retroflexus) Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)	4.0-8.0	
Espinaca	Zacate rayado (Echinochloa crus-galli) Cola de ardilla, liendrilla* (Eragrostis mexicana) Luzaga, zacate pata de gallina * (Digitaria sanguinalis) Pasto de conejo, zacate mota* (Chloris virgata) Zacate camalote (Brachiaria plantaginea)	1.0-2.0	SIN LÍMITE
	Mala mujer (Solanum nigrum) Bledo común (Amaranthus spinosum) Quelite, bledo (Amaranthus albus) Quelite cenizo (Chenopodium album) Campanilla (Ipomoea purpurea) Verdolaga (Portulaca oleracea) Bolsa del pastor (Capsella bursa-pastoris) Malva (Malva sp.)	1.5-3.0	
	Lechosa, golondrina (Euphorbia heterophylla) Zacate Johnson (Sorghum halepense)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (Thithonia tubaeiformis)	3.0-4.0	
	Coquillo (Cyperus sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)	4.0-8.0	
	Zacate rayado (Echinochloa crus-galli) Cola de ardilla, liendrilla* (Eragrostis mexicana) Luzaga, zacate pata de gallina * (Digitaria sanguinalis) Pasto de conejo, zacate mota* (Chloris virgata) Zacate camalote (Brachiaria plantaginea)	1.0-2.0	
	Mala mujer (Solanum nigrum) Verdolaga (Potulaca oleracea) Bledo común (Amaranthus spinosum) Quelite, bledo (Amaranthus albus) Quelite cenizo (Chenopodium album) Bolsa del pastor (Capsella bursa-pastoris) Malva (Malva sp.) Campanilla (Ipomoea purpurea)	1.5-3.0	
	Zacate Johnson (Sorghum halepense)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (Thithonia tubaeiformis)	3.0-4.0	
Frijol	Zacate rayado (Echinochloa crus-galli) Cola de ardilla, liendrilla* (Eragrostis mexicana) Luzaga, zacate pata de gallina * (Digitaria sanguinalis) Pasto de conejo, zacate mota* (Chloris virgata) Zacate camalote (Brachiaria plantaginea)	1.0-2.0	SIN LÍMITE
	Mala mujer (Solanum nigrum) Verdolaga (Potulaca oleracea) Bledo común (Amaranthus spinosum) Quelite, bledo (Amaranthus albus) Quelite cenizo (Chenopodium album) Bolsa del pastor (Capsella bursa-pastoris) Malva (Malva sp.) Campanilla (Ipomoea purpurea)	1.5-3.0	
	Zacate Johnson (Sorghum halepense)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (Thithonia tubaeiformis)	3.0-4.0	
	Coquillo (Cyperus sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)	4.0-8.0	
	Zacate rayado (Echinochloa crus-galli) Cola de ardilla, liendrilla* (Eragrostis mexicana) Luzaga, zacate pata de gallina * (Digitaria sanguinalis) Pasto de conejo, zacate mota* (Chloris virgata) Zacate camalote (Brachiaria plantaginea)	1.0-2.0	
	Mala mujer (Solanum nigrum) Verdolaga (Potulaca oleracea) Bledo común (Amaranthus spinosum) Quelite, bledo (Amaranthus albus) Quelite cenizo (Chenopodium album) Bolsa del pastor (Capsella bursa-pastoris) Malva (Malva sp.) Campanilla (Ipomoea purpurea)	1.5-3.0	
	Zacate Johnson (Sorghum halepense)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (Thithonia tubaeiformis)	3.0-4.0	
Guayabo	Zacate rayado (Echinochloa crus-galli) Cola de ardilla, liendrilla* (Eragrostis mexicana) Luzaga, zacate pata de gallina * (Digitaria sanguinalis) Pasto de conejo, zacate mota* (Chloris virgata) Zacate camalote (Brachiaria plantaginea)	1.0-2.0	SIN LÍMITE
	Mala mujer (Solanum nigrum) Verdolaga (Potulaca oleracea) Bledo común (Amaranthus spinosum) Quelite, bledo (Amaranthus albus) Quelite cenizo (Chenopodium album) Bolsa del pastor (Capsella bursa-pastoris) Malva (Malva sp.) Campanilla (Ipomoea purpurea)	1.5-3.0	
	Zacate Johnson (Sorghum halepense)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (Thithonia tubaeiformis)	3.0-4.0	
	Coquillo (Cyperus sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)	4.0-8.0	
	Zacate rayado (Echinochloa crus-galli) Cola de ardilla, liendrilla* (Eragrostis mexicana) Luzaga, zacate pata de gallina * (Digitaria sanguinalis) Pasto de conejo, zacate mota* (Chloris virgata) Zacate camalote (Brachiaria plantaginea)	1.0-2.0	
	Mala mujer (Solanum nigrum) Verdolaga (Potulaca oleracea) Bledo común (Amaranthus spinosum) Quelite, bledo (Amaranthus albus) Quelite cenizo (Chenopodium album) Bolsa del pastor (Capsella bursa-pastoris) Malva (Malva sp.) Campanilla (Ipomoea purpurea)	1.5-3.0	
	Zacate Johnson (Sorghum halepense)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (Thithonia tubaeiformis)	3.0-4.0	

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/HA	INTERVALO DE SEGURIDAD (días) ²					
	Coquillo (Cyperus sp.)	4.0-6.0						
	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)							
	Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)	4.0-8.0						
	Jitomate	Lechosa, golondrina (Euphorbia heterophylla)		2.0-4.0	SIN LÍMITE			
		Zacate Johnson (Sorghum halepense)						
Lampotillo, gigantón, acahual*(Thithonia tubaeiformis)		3.0-4.0						
Coquillo (Cyperus sp.)		4.0-6.0						
Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)								
Bledo rojo (Amaranthus retroflexus)	4.0-8.0							
Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)								
Lechuga	Lechosa, golondrina (Euphorbia heterophylla)			2.0-4.0	SIN LÍMITE			
	Zacate Johnson (Sorghum halepense)							
	Lampotillo, gigantón, acahual*(Thithonia tubaeiformis)		3.0-4.0					
	Coquillo (Cyperus sp.)	4.0-6.0						
	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)							
Bledo rojo (Amaranthus retroflexus)	4.0-8.0							
Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)								
Limonero	Lampotillo, gigantón, acahual*(Thithonia tubaeiformis)			3.0-4.0	SIN LÍMITE			
Maíz	Zacate rayado (Echinochloa crus-galli)		1.0-2.0	SIN LÍMITE				
	Cola de ardilla, liendrilla*(Eragrostis mexicana)							
	Luzaga, zacate pata de gallina *(Digitaria sanguinalis)							
	Pasto de conejo, zacate mota* (Chloris virgata)							
	Zacate camalote (Brachiaria plantaginea)							
	Mala mujer (Solanum nigrum)	1.5-3.0						
	Quelite, bledo (Amaranthus albus)							
	Bledo común (Amaranthus spinosum)							
	Quelite cenizo (Chenopodium album)							
	Bolsa del pastor (Capsella bursa-pastoris)							
	Verdolaga (Portulaca oleracea)	2.0-4.0						
	Malva (Malva sp.)							
	Campanilla (Ipomoea purpurea)							
	Lechosa, golondrina (Euphorbia heterophylla)							
	Zacate Johnson (Sorghum halepense)							
	Lampotillo, gigantón, acahual*(Thithonia tubaeiformis)	3.0-4.0						
	Coquillo (Cyperus sp.)	4.0-6.0						
	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)							
	Bledo rojo (Amaranthus retroflexus)	4.0-8.0						
	Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)							
Mango	Zacate rayado (Echinochloa crus-galli)	1.0-2.0		SIN LÍMITE				
	Cola de ardilla, llendrilla*(Eragrostis mexicana)							
	Luzaga, zacate pata de gallina *(Digitaria sanguinalis)							
	Pasto de conejo, zacate mota* (Chloris virgata)							
	Zacate camalote (Brachiaria plantaginea)							
	Mala mujer (Solanum nigrum)	1.5-3.0						
	Quelite, bledo (Amaranthus albus)							
	Bledo común (Amaranthus spinosum)							
	Quelite cenizo (Chenopodium album)							
	Bolsa del pastor (Capsella bursa-pastoris)							
	Verdolaga (Portulaca oleracea)	2.0-4.0						
	Malva (Malva sp.)							
	Campanilla (Ipomoea purpurea)							
	Zacate Johnson (Sorghum halepense)							
	Lampotillo, gigantón, acahual*(Thithonia tubaeiformis)							
Coquillo (Cyperus sp.)	4.0-6.0							
Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)								
Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)	4.0-8.0							

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/HA	INTERVALO DE SEGURIDAD (días) ²
Manzano	Zacate rayado (Echinochloa crus-galli)	1.0-2.0	SIN LÍMITE
	Cola de ardilla, liendrilla* (Eragrostis mexicana)		
	Luzaga, zacate pata de gallina * (Digitaria sanguinalis)		
	Pasto de conejo, zacate mota* (Chloris virgata)		
	Zacate camalote (Brachiaría plantaginea)		
	Mala mujer (Solanum nigrum)	1.5-3.0	
	Bledo común (Amaranthus spinosum)		
	Quelite cenizo (Chenopodium album)		
	Bolsa del pastor (Capsella bursa-pastoris)		
	Verdolaga (Portulaca oleracea)		
	Malva (Malva sp.)	2.0-4.0	
	Campanilla (Ipomoea purpurea)		
Lechosa, golondrina (Euphorbia heterophylla)			
Zacate Johnson (Sorghum halepense)			
Lampotillo, gigantón, acahual* (Thithonia tubaeiformis)			
Coquillo (Cyperus sp.)	4.0-6.0		
Bledo rojo (Amaranthus retroflexus)			
Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)			
Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)			
Melon	Lechosa, golondrina (Euphorbia heterophylla)	2.0-4.0	SIN LÍMITE
	Zacate Johnson (Sorghum halepense)	3.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (Thithonia tubaeiformis)		
	Coquillo (Cyperus sp.)	4.0-6.0	
	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)		
	Bledo rojo (Amaranthus retroflexus) Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)		
		4.0-8.0	
Mostaza	Lechosa, golondrina (Euphorbia heterophylla)	2.0-4.0	SIN LÍMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual* (Thithonia tubaeiformis)	3.0-4.0	
	Coquillo (Cyperus sp.)	4.0-6.0	
	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)		
	Bledo rolo (Amaranthus retroflexus) Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)		
Nectario	Zacate rayado (Echinochloa crus-galli)	1.0-2.0	SIN LÍMITE
	Cola de ardilla, liendrilla* (Eragrostis mexicana)		
	Luzaga, zacate pata de gallina * (Digitaria sanguinalis)		
	Zacate camalote (Brachiaría plantaginea)		
	Pasto de conejo, zacate mota* (Chloris virgata)		
	Mala mujer (Solanum nigrum)	1.5-3.0	
	Bledo común (Amaranthus spinosum)		
	Malva (Malva sp.)		
	Quelite cenizo (Chenopodium album)		
	Bolsa del pastor (Capsella bursa-pastoris)		
	Verdolaga (Portulaca oleracea)	1.5-3.0	
	Campanilla (Ipomoea purpurea)		
	Lampotillo, gigantón, acahual* (Thithonia tubaeiformis)		
Zacate Johnson (Sorghum halepense)			
Coquillo (Cyperus sp.)	4.0-6.0		
Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)			
Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)			

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/HA	INTERVALO DE SEGURIDAD (días) ²
Nogal	Zacate rayado (Echinochloa crus-galli) Cola de ardilla, liendrilla* (Eragrostis mexicana) Luzaga, zacate pata de gallina * (Digitaria sanguinalis) Pasto de conejo, zacate mota* (Chloris virgata) Zacate camalote (Brachiaria plantaginea)	1.0-2.0	SIN LÍMITE
	Mala mujer (Solanum nigrum) Bledo común (Amaranthus spinosum) Quelite cenizo (Chenopodium album) Bolsa del pastor (Capsella bursa-pastoris) Verdolaga (Portulaca oleracea) Malva (Malva sp.) Campanilla (Ipomoea purpurea)	1.5-3.0	
	Lechosa, golondrina (Euphorbia heterophylla) Zacate Johnson (Sorghum halepense) Bledo rojo (Amaranthus retroflexus)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (Thithonia tubaeiformis)	3.0-4.0	
	Coquillo (Cyperus sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)	4.0-8.0	
	Lechosa, golondrina (Euphorbia heterophylla) Zacate Johnson (Sorghum halepense)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (Thithonia tubaeiformis)	3.0-4.0	
	Coquillo (Cyperus sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)	4.0-6.0	
	Bledo rojo (Amaranthus retroflexus) Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)	4.0-8.0	
Papayo	Lampotillo, gigantón, acahual* (Thithonia tubaeiformis)	3.0-4.0	SIN LÍMITE
Pastos	Lechosa, golondrina (Euphorbia heterophylla) Zacate Johnson (Sorghum halepense) Lampotillo, gigantón, acahual* (Thithonia tubaeiformis)	2.0-4.0 3.0-4.0	SIN LÍMITE
	Coquillo (Cyperus sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)	4.0-6.0	
	Bledo rojo (Amaranthus retroflexus) Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)	4.0-8.0	
	Lechosa, golondrina (Euphorbia heterophylla) Zacate Johnson (Sorghum halepense)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (Thithonia tubaeiformis)	3.0-4.0	
Pepino	Coquillo (Cyperus sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)	4.0-6.0	SIN LÍMITE
	Bledo rojo (Amaranthus retroflexus) Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)	4.0-8.0	
	Zacate rayado (Echinochloa crus-galli) Cola de ardilla, liendrilla* (Eragrostis mexicana) Luzaga, zacate pata de gallina * (Digitaria sanguinalis) Pasto de conejo, zacate mota* (Chloris virgata) Zacate camalote (Brachiaria plantaginea)	1.0-2.0	
	Mala mujer (Solanum nigrum) Bledo común (Amaranthus spinosum) Malva (Malva sp.) Quelite cenizo (Chenopodium album) Bolsa del pastor (Capsella bursa-pastoris) Verdolaga (Portulaca oleracea) Campanilla (Ipomoea purpurea)	1.5-3.0	
	Lechosa, golondrina (Euphorbia heterophylla) Zacate Johnson (Sorghum halepense)	2.0-4.0	
Peral	Lampotillo, gigantón, acahual* (Thithonia tubaeiformis)	3.0-4.0	SIN LÍMITE
	Coquillo (Cyperus sp.) Bledo rojo (Amaranthus retroflexus) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)	4.0-8.0	
	Lechosa, golondrina (Euphorbia heterophylla) Zacate Johnson (Sorghum halepense)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (Thithonia tubaeiformis)	3.0-4.0	

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/HA	INTERVALO DE SEGURIDAD (días) ²
Platano	Zacate rayado (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Cola de ardilla, liendrilla* (<i>Eragrostis mexicana</i>) Luzaga, zacate pata de gallina* (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Pasto de conejo, zacate mota* (<i>Chloris virgata</i>) Zacate camalote (<i>Brachiaria plantaginea</i>)	1.0-2.0	SIN LÍMITE
	Mala mujer (<i>Solanum nigrum</i>) Bledo común (<i>Amaranthus spinosum</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Bolsa del pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Malva (<i>Malva sp.</i>) Campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>)	1.5-3.0	
	Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Tithonia tubaeformis</i>)	3.0-4.0	
	Zacate pitillo (<i>Ixophorus unisetus</i>) Zacate guinea (<i>Panicum maximum</i>) Rosilla (<i>Gallinsoga hispida</i>) Pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>) Zacate hierba del conejo (<i>Digitaria filiformis</i>) Acahualillo (<i>Bidens pilosa</i>) Golondrina, arlomo (<i>Boerhavia erecta</i>) Borreria, botón blanco* (<i>Borreria ocimoides</i>) Cola de zorra (<i>Setaria lutescens</i>) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>) Zacate (<i>Paspalum virginata</i>) Arroz rojo (<i>Oryza sativa</i>) Mozote, zacate cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>) Zacate (<i>Hyparrhenia rufa</i>) Coquillo, coyotillo* (<i>Cyperus rotundus</i>)	4.0	
	Hierba del pollo (<i>Commelina erecta</i>)	5.0	
	Coquillo (<i>Cyperus sp.</i>)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Tithonia tubaeformis</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus sp.</i>) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Tithonia tubaeformis</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus sp.</i>) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
Sandia	Zacate rayado (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Cola de ardilla, liendrilla* (<i>Eragrostis mexicana</i>) Luzaga, zacate pata de gallina* (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Pasto de conejo, zacate mota* (<i>Chloris virgata</i>) Zacate camalote (<i>Brachiaria plantaginea</i>)	1.0-2.0	SIN LÍMITE
	Mala mujer (<i>Solanum nigrum</i>) Bledo común (<i>Amaranthus spinosum</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Bolsa del pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Malva (<i>Malva sp.</i>) Campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>)	1.5-3.0	
	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	
Sorgo	Zacate rayado (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Cola de ardilla, liendrilla* (<i>Eragrostis mexicana</i>) Luzaga, zacate pata de gallina* (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Pasto de conejo, zacate mota* (<i>Chloris virgata</i>) Zacate camalote (<i>Brachiaria plantaginea</i>)	1.0-2.0	SIN LÍMITE
	Mala mujer (<i>Solanum nigrum</i>) Bledo común (<i>Amaranthus spinosum</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Bolsa del pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Malva (<i>Malva sp.</i>) Campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>)	1.5-3.0	
Sorgo	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	SIN LÍMITE

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/HA	INTERVALO DE SEGURIDAD (días) ²	
Soya	Lampotillo, gigantón, acahual* (Thithonia tubaeiformis)	3.0-4.0	SIN LÍMITE	
	Coquillo (Cyperus sp.)	4.0-6.0		
	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)			
	Bledo rojo (Amaranthus retroflexus)	4.0-8.0		
	Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)			
	Zacate rayado (Echinochloa crus-galli)	1.0-2.0		
	Cola de ardilla, liendrilla* (Eragrostis mexicana)			
	Luzaga, zacate pata de gallina * (Digitaria sanguinalis)			
	Pasto de conejo, zacate mota*(Chloris virgata)			
	Zacate camalote (Brachiaria plantaginea)			
	Lampotillo, gigantón, acahual*(Thithonia tubaeiformis)	1.5-3.0		SIN LÍMITE
	Mala mujer (Solanum nigrum)			
	Bledo común (Amaranthus spinosum)			
	Quelite cenizo (Chenopodium album)			
	Bolsa del pastor (Capsella bursa-pastoris)			
Verdolaga (Portulaca oleracea)				
Malva (Malva sp.)	2.0-4.0			
Campanilla (Ipomoea purpurea)				
Lechosa, golondrina (Euphorbia heterophylla)				
Zacate Johnson (Sorghum halepense)				
Coquillo (Cyperus sp.)	4.0-6.0			
Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)				
Bledo rojo (Amaranthus retroflexus)	4.0-8.0			
Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)				
Trigo	Zacate rayado (Echinochloa crus-galli)	1.0-2.0	SIN LÍMITE	
	Cola de ardilla, liendrilla*(Eragrostis mexicana)			
	Luzaga, zacate pata de gallina * (Digitaria sanguinalis)			
	Pasto de conejo, zacate mota*(Chloris virgata)			
	Zacate camalote (Brachiaria plantaginea)			
	Mala mujer (Solanum nigrum)	1.5-3.0		
	Bledo común (Amaranthus spinosum)			
	Quelite cenizo (Chenopodium album)			
	Bolsa del pastor (Capsella bursa-pastoris)			
	Verdolaga (Portulaca oleracea)			
	Malva (Malva sp.)			
	Campanilla (Ipomoea purpurea)	2.0-4.0		
	Lechosa, golondrina (Euphorbia heterophylla)			
	Zacate Johnson (Sorghum halepense)			
	Lampotillo, gigantón, acahual* (Thithonia tubaeiformis)			
Coquillo (Cyperus sp.)	4.0-6.0			
Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)				
Bledo rojo (Amaranthus retroflexus)	4.0-8.0			
Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)				
Vid	Zacate rayado (Echinochloa crus-galli)	4.0-8.0	SIN LÍMITE	
	Cola de ardilla, liendrilla* (Eragrostis mexicana)			
	Luzaga, zacate pata de gallina * (Digitaria sanguinalis)			
	Pasto de conejo, zacate mota* (Chloris virgata)			
	Zacate camalote (Brachiaria plantaginea)			
	Mala mujer (Solanum nigrum)	1.0-2.0		
	Bledo común (Amaranthus spinosum)			
	Quelite cenizo (Chenopodium album)			
	Bolsa del pastor (Capsella bursa-pastoris)			
	Verdolaga (Portulaca oleracea)			
	Malva (Malva sp.)			
	Campanilla (Ipomoea purpurea)	1.5-3.0		
	Zacate Johnson (Sorghum halepense)			
	Bledo rojo (Amaranthus retroflexus)			
	Lampotillo, gigantón, acahual*(Thithonia tubaeiformis)			
Coquillo (Cyperus sp.)	2.0-4.0			
Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)				
Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)				

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/HA	INTERVALO DE SEGURIDAD (días) ²
Zanahoria	Lechosa, golondrina (Euphorbia heterophylla)	2.0-4.0	SIN LÍMITE
	Zacate Johnson (Sorghum halepense)		
	Lampotillo, gigantón, acahual* (Thithonia tubaeiformis)	3.0-4.0	
	Coquillo (Cyperus sp.)		
	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (Cynodon dactylon)	4.0-6.0	
	Bledo rojo (Amaranthus retroflexus)		
	Correhuela, gloria de la mañana (Convolvulus arvensis)	4.0-8.0	

¹ **Observaciones.** Realizar una aspersión en post-emergencia al cultivo y maleza; volumen de aplicación 300 - 400 L/ha

² **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas después de la aplicación.

LMR(Límite Máximo de Residuos):

CULTIVO	LMR (mg/kg)	FUENTE
Acelga	0.1	Unión Europea
Agave	No aplica	
Aguacate		EPA*
Ajo	0.1	Unión Europea
Alcachofa	0.2	EPA
Alfalfa	0.5	EPA
Apio	0.1	Unión Europea
Arroz	0.1	EPA
Avena	20.0	Unión Europea
Berenjena	0.1	EPA
Betabel	10	EPA
Brócoli	0.2	EPA
Cacahuete	0.1	EPA
Cacao	0.2	EPA
Cafeto	1.0	EPA
Calabaza	0.5	EPA
Caña de azúcar	2.0	EPA
Cebada	30.0	EPA
Cebolla	0.1	Unión Europea
Centeno	10.0	Unión Europea
Chícharo	8.0	EPA
Chile	0.1	EPA
Ciruelo	0.1	Unión Europea

Cítricos	0.5	EPA
Coliflor	0.2	EPA
Durazno	0.1	Unión Europea
Espinaca	0.2	EPA
Frijol	5.0	EPA
Guayabo	0.2	EPA
Jitomate	0.1	EPA
Lechuga	0.2	EPA
Limonero	0.5	EPA
Maíz	5.0	EPA
Mango	0.2	EPA
Manzano	0.1	Unión Europea
Melón	0.5	EPA
Mostaza	10.0	Unión Europea
Nectarino	0.1	Unión Europea
Nogal	0.1	Unión Europea
Papa	0.1	EPA
Papaya	0.2	EPA
Pastos		No aplica
Pepino	0.5	EPA
Peral	0.1	Unión Europea
Plátano	0.2	EPA
Rábano	0.1	Unión Europea
Sandía	0.5	EPA
Sorgo	20.0	Unión Europea
Soya	20.0	EPA
Trigo	10	Unión Europea
Vid	0.5	Unión Europea
Zanahoria	5.0	EPA

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Para abrir el envase, es importante vestir el equipo de protección adecuado, abra con cuidado el envase. Mida con una probeta de plástico o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad de producto a usar; mezcle con agua la cantidad de producto a usar en la mochila de aspersión

CAYAANA es una formulación diseñada para aplicarse exclusivamente en los cultivos y malezas indicados en esta etiqueta utilizando para ello equipos de aplicación terrestres, asperjando la maleza con las boquillas adecuadas, por lo que es esencial que todo sistema de flujo sea calibrado previamente. Mézclese la dosis de **CAYAANA** en la cantidad necesaria de agua para cubrir una hectárea. La cantidad de agua variará de acuerdo con la altura de la maleza y la forma de aplicación; sin embargo, se recomienda que el volumen de aspersión no varíe de 300 a 400 L/ha. Llenar el tanque con agua limpia hasta más de la mitad de su capacidad, agregue la cantidad recomendada de producto, agitando continuamente, agréguese finalmente el resto de agua.

CONTRAINDICACIONES.

Evite que el viento lleve la aspersión a plantas susceptibles como algodónero, frijol, soya, chícharo, tomate. Hortalizas, plantas ornamentales y en general cualquier cultivo ya que es un herbicida no selectivo.

INCOMPATIBILIDAD.

No se recomienda **CAYAANA** en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en el cultivo recomendado en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

“MANEJO DE RESISTENCIA”:

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”