



DURMINA 40®

2,4-D

Herbicida agrícola / Solución concentrada acuosa

RSCO-HEDE-0222-003-014-050

RAI

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO:

2,4-D: Sal dimetilamina del ácido 2,4-Diclorofenoxiacético "Con un contenido de ácido 2,4-D, no menor de 83%" (Equivalente a 480g de i.a. /L a 20°C) **49.50%**

Ingredientes Inertes:

Diluyentes (agua), humectante, anti-espumante, quelante y compuestos relacionados. **18.0%**

TOTAL: **100.0%**



“NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN”

“NOCIVO SI SE INHALA”

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4 PRECAUCIÓN

“ALTO LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

INFORMACIÓN GENERAL:

Durmina® es un herbicida selectivo que se emplea para el control de malezas de hoja ancha en los cultivos que a continuación se indican:

PLAGA	CULTIVO	DOSIS L/HA	INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN
CORREHUELA ANUAL / <i>Ipomoea purpurea</i>	MAÍZ	2.0-3.0	Aplíquese en post-emergencia dirigida cuando el maíz tenga más de 20 cm. No aplique durante la formación de la espiga o jilote. Aplicar la hierba tierna.
GIRASOL / <i>Helianthus annuus</i>			
VERDOLAGA / <i>Portulaca oleracea</i>	SORGO	1.0-2.0	Aplique cuando la planta tenga de 3 a 5 hojas y de 10 a 20 cm de altura y la maleza 5 cm. Cuando el sorgo tenga más de 5 hojas dirigir la aplicación a la maleza.
DIENTE DE LEÓN / <i>Taraxacum officinale</i>			
BLEDO / <i>Amaranthus spp</i>			
TOMATILLO / <i>Physalis angulata</i>	CAÑA DE AZÚCAR	4.0-6.0	Aplique en post-emergencia al cultivo y post-emergencia temprana a la maleza. (Menos de 5 cm de altura).
MALVA / <i>Malva neglecta</i>			
ACAHUAL / <i>Tithonia tubaeiformis</i>			
LENGUA DE VACA / <i>Rumex crispus</i>	ARROZ	1.5-2.0	Aplique cuando el arroz haya amacollado, pero antes del encañe.
ORTIGA / <i>Urtica sp</i>			
MOSTAZA / <i>Brassica spp</i>	TRIGO DE CEBADA	0.5-2.0	Aplique cuando las plantas estén amacollando, pero antes del encañe.
CARDO / <i>Cirsium arvense</i>			

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Durmina® es completamente soluble en agua y de fácil aplicación, ya sea con aspersora de mochila o tractor. La cantidad de agua varía de acuerdo con el equipo. Para obtener mejores resultados, úsese la cantidad de agua suficiente para lograr un buen cubrimiento de la maleza existente preferentemente cuando ésta esté en crecimiento activo, es decir post-emergencia temprana. En general, para preparar la mezcla, se puede utilizar de 200 a 400 litros de agua.

CONTRAINDICACIONES:

Evite que el viento lleve la aspersión a plantas susceptibles como algodón, frijol, soja, chícharo, tomate, hortalizas, plantas ornamentales y en general cualquier cultivo de hoja ancha.

FITOTOXICIDAD:

Este producto no es fitotóxico a los cultivos recomendados y a las dosis aquí indicadas, pero es sumamente fitotóxico a los cultivos de hoja ancha y plantas ornamentales.

INCOMPATIBILIDAD:

No se recomienda **Durmina®** en mezclas de tanque. Si desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en el cultivo recomendado en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.